

| Nr.           | Merkmal   | Ausprägungsstufe /<br>Angabe in [..]  | Note                                      |
|---------------|---|---|---|
| <b>37305.</b> | Ertragsbeginn (mind. 1 Frucht/Rute):<br>a) Datum<br>b) Anzahl Tage vom Blühende bis zur ersten Ernte<br>c) Anzahl Tage vor/nach Termin für die Referenzsorte (Schönemann, Autumn Bliss)                         | [Datum], [d]  |   |
| <b>37306.</b> | Ertragsende (max. 1 Frucht/Rute):<br>a) Datum<br>b) Anzahl Tage vom Blühende bis zur letzten Ernte<br>c) Anzahl Tage vor/nach Termin für die Referenzsorte  | [Datum], [d]  |   |
| <b>37308.</b> | Ertrag (für jeden Pflücktermin)<br>a) je Rute<br>b) je Fläche (ausgefallene Ruten sind herauszurechnen [siehe Merkmal 37124])   | a) [g/Rute]<br>b) [kg/afd.m <sub>netto</sub> ]  |   |
| <b>37309.</b> | Mittlerer Ertrag (gewogenes arithmetisches Mittel:<br>[(Menge1.PflückexGewicht1.Pflücke) + (Menge2.PflückexGewicht2.Pflücke)+(...)] / Gesamtmenge; nicht vermarktungsfähige Früchte sind gesondert zu erfassen) | [kg]  |   |
| <b>37315.</b> | Ablösbarkeit des Zapfens  | sehr schlecht<br>schlecht<br>mittel<br>gut<br>sehr gut  | 1<br>3<br>5<br>7<br>9                     |
| <b>37316.</b> | Bestachelung des Fruchtstiels   | fehlend<br>gering<br>mittelstark<br>stark<br>sehr stark   | 1<br>3<br>5<br>7<br>9                     |
| <b>37318.</b> | Pflückbarkeit (ggf. Begründung anführen)  | sehr schlecht<br>schlecht<br>mittel<br>gut<br>sehr gut  | 1<br>3<br>5<br>7<br>9                     |
| <b>37325.</b> | Zur Ernte: Befall durch parasitäre Krankheiten und Schädlinge (siehe Anhang)  | fehlend<br>sehr gering bis gering<br>gering<br>gering bis mittel<br>mittel<br>mittel bis stark<br>stark<br>stark bis sehr stark<br>sehr stark | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 |

